
Citrus sinensis "Washington Navel"



La pianta ï vigorosa e di sviluppo medio, con marcata tendenza a ramificarsi orizzontalmente o verso il basso, per cui ha un caratteristico portamento raccolto.
Su arancio amaro il tronco si sviluppa poco pïï del portainnesto mentre il contrario avviene su Troyer o Poncirus tipica costolatura del soggetto. Le foglie sono grandi e di colore verde scuro. I fiori si presentano con antere di colore crema essendo prive di polline. Il frutto ï ovoide o schiacciato o ellittico, di colore arancio scuro, con tendenza al rossastro a maturazione, di pezzatura media o grossa (g 120-250) con ombelico tanto pïï pronunziato quanto pïï grossa ï la grana del frutto. La polpa ï di tessitura fine e soda, di straordinaria qualitï e senza semi. Maturazione da metï dicembre a marzo. Produzione da media a buona ed alternante con media persistenza del frutto maturo sulla pianta. L inizio della fruttificazione ha luogo al 4ï -5ï anno e la produttivitï ï di un certo livello all 8ï anno dall impianto.

Categoria: Citrus (Agrumi)
Famiglia: Rutaceae
Genere: Citrus
Specie: sinensis "Washington Navel"
Area Geografica d'Origine: Europa mediterranea
Zone Climatiche: Sub-Tropicale, Coste Sud Italia ed Isole USDA 10 b
Portamento / Tipologia: Albero
Foglie: Foglia Persistente / Sempreverde
Colore Foglie: Verde
Periodo di Fioritura: Gennaio / Febbraio / Marzo / Dicembre
Fiore: Fiore semplice
Colore Fiori: Bianco
Suolo: Sub-acido / Medio-Impasto
Esigenza Idrica: Media
Esposizione alla Luce: Mezzombra / Piena Luce
Forma: Fitocella / Alberello

Colore Frutti: Arancione 
Profumata: Si