
Cereza cepillo



Syzygium australe (= Eugenia australe; = Eugenia myrtifolia), comï nmente llamadoï cereza cepilloï (Brush Cherry), es unaï especieï de plantaï fanerï gamaï perteneciente a la familia de lasï mirtï ceas.
Es un ï rbol de losï bosques templados hï medosï que es nativo del este deï Australia. Puede lograr una altura de 35 m con un diï metro de 6ï dm. Lasï hojasï son opuestas, simples, lanceoladas de 4-8 cm de largo. Lasï floresï son blancas y en racimos. Lasï frutasï de color rojo oscuro son comestibles. La cereza cepillo es comï nmente cultivado en el este de Australia, mayormente en sus cultivares mï s pequeï os y arbustivos. Esos son especialmente populares como setos. Las agradables frutas ï cidas se comen tambiï n frescas o cocinadas. La fruta puede ser usada para elaborarï mermeladasï y jaleas. Comï nmente confundida conï Syzygium paniculatum, lilly pilly magenta.ï
Es una planta bastante resistente que puede soportar el frï o fï cilmente; en los perï odos mï s frï os del aï o, de hecho, no tenemos que preocuparnos por las temperaturas mï nimas; Puede soportar una temperatura de unos pocos grados bajo cero: puede soportar hasta -5ï C, siempre que estï en un lugar soleado y protegido de los vientos frï os. Alternativamente, puede cultivarse en macetas grandes y mantenerse en interiores.
Le gustan los lugares luminosos, pero no debe exponerse a los rayos directos: solo necesita unas pocas horas de sol al dï a.
Prefiere un sustrato fï rtil, ligero y bien drenado. Se fertiliza en otoï o y primavera con un producto orgï nico o de liberaciï n lenta y se debe regar bien durante los perï odos cï lidos, teniendo cuidado de no dejar que el agua se estanque en las raï ces.
Para un desarrollo floreciente, es importante recordar fertilizar periï dicamente nuestros arbustos; En la primavera, usamos un fertilizante rico en nitrï geno y potasio, que favorecerï el desarrollo de nuevas hojas y nuevas flores. Podemos intervenir al final del invierno mezclando el suelo alrededor de la planta con una buena dosis de fertilizante orgï nico o fertilizante quï mico de liberaciï n lenta. En primavera, se recomienda intervenir periï dicamente, con fertilizantes lï quidos o en polvo, para agregar al agua para el riego, cada 20-25 dï as.
Recuerde que para estimular el desarrollo de nuevo follaje, es aconsejable acortar ligeramente todas las ramas de la planta, a fin de eliminar las hojas secas y promover el desarrollo de brotes.

Categorï a: Plantas de follaje al aire libre
Familia: Myrtaceae
Gï nero: Eugenia
Especie: myrtifolia "New Port"
Zona Geogrï fica de Origen: Oceanï a
Zonas Climï ticas: Mediterraneo: Sud ed Isole, Colina USDA 10 a
Porte: Arbusto
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde ï Arancione
Periodo de Floraciï n: Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Panï cula
Colore Fiori: Giallo
Suelo: Medianamente acido / Neutro / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol

Forma: Piramide / Arbusto / Columna
Colore Frutti: Rosso 