Limero



llamado limero (C. micrantha x C. medica), es una especie arbï rea de la familia de las rutï ceas, es un ï rbol frutal perteneciente al gï nero Citrus (cï tricos).
Es una especie hï brida de Citrus micrantha ï Citrus medica, oriunda del sudeste de Asia e introducida en Europa en tiempos de las Cruzadas a travï s del Medio Oriente y ï frica del Norte.
ï rbolï perenneï muy parecido alï naranjo, de unos 6ï mï de altura, y tronco habitualmente torcido, se ramifica densamente desde muy abajo. Las ramas poseen espinas cortas y duras que surgen de las axilas, con hojas perennes aovadas de entre 2,5ï a 9ï cm de color verde semejantes a las delï naranjo, de ahï su nombre latino *aurantifolia*. Lasï floresï (fragantes como todas las del gï nero), de unos 2,5ï cm, son de color blanco amarillento, con una fina lï nea pï rpura en los bordes, con la corola de cinco pï talos. El fruto es una baya de color amarillo ovoide esfï rica, con cï scara de color amarillo y pulpa jugosa y ï cida.
Existen diferentesï cultivaresï deï *aurantifolia*ï con diversos grados de acidez y colores que varï an del verde al amarillo.

Categorï a: Citrus
Familia: Rutaceae
Gï nero: Citrus
Especie: x aurantiifolia
Zona Geogrï fica de Origen: El sudeste de Asia
Zonas Climï ticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbusto
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Marzo / Aprile / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Bianco
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Poca agua / Media agua

Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Arbol
Colore Frutti: Giallo
Perfumado: Si