
El naranjo espinoso



El naranjo espinoso o trifoliado (Poncirus trifoliata, sin. Citrus trifoliata) es un ï rbol frutal de la familia de las Rutï ceas, estrechamente emparentado con los citrus y originario del norte de China. Por su superior resistencia al frï o se utiliza como base para el injerto de varias especies de citrus en plantaciones comerciales. Su fruto propio es similar al del naranjo dulce, Citrus ï sinensis, pero de sabor amargo y cï scara ligeramente vellosa.ï

El naranjo espinoso es un ï rbol caducifolio de porte pequeï o, entre 4 y 8 m. Los brotes tiernos y leï osos estï n cubiertos de espinas de hasta 5 cm de largo y gran dureza. Las hojas son palmatisectas, con tres o mï s raramente cinco folï olos, siendo el central mï s largo, de hasta 5 cm, coriï ceas, con el haz y el envï s verde oscuro. Las flores aparecen en verano; son mayores que las de los cï tricos pero muy similares a estas, de color blanco, pentï meras, con los estambres de color rosï ceo, muy vistosas y algo menos fragantes que el azahar pero con distintivo aroma. El fruto es un hesperidio de color verde, virando al amarillo con la madurez; es piriforme o globoso, de hasta 5 cm de diï metro, recubierto de una cï scara gruesa, fragante, con glï ndulas oleosas bien visibles, ï spera al tacto y ligeramente pubescente. La pulpa es escasa y de sabor acre. Contiene numerosas semillas ovoides de color grisï ceo.

El naranjo espinoso resiste el frï o mejor que los cï tricos, y tolera temperaturas hasta los 0ï C, asï como heladas y algo de nieve.ï

Por sï solo se cultiva para setos y vallados, donde sus firmes espinas lo hacen valioso, pero su uso principal es como portainjerto de otros cï tricos, aprovechando su resistencia para plantarlos donde no crecerï an sobre su propia raï z. Tambiï n tiene algï n uso como ornamental en sitios donde los cï tricos normales no arraigarï an.

Categorï a: Citrus
Familia: Rutaceae
Gï nero: Poncirus
Especie: trifoliata
Zona Geogrï fica de Origen: Lejano Oriente / Asia oriental
Zonas Climï ticas: Montaï a subalpina Usda 8

Porte: Arbusto
Hojas: Caducifolio
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Aprile
Flor: Raï m (inflorescï ncia)
Colore Fiori: Bianco
Suelo: Medianamente acido / Acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Arbol
Colore Frutti: Verde ï Giallo
Perfumado: Si