
La naranja washington navel



La naranja washington navel es una variedad originada a partir de una mutaciï n espontï nea de washington en la zona de lemon cove, california, donde fue descubierta en 1935 y comenzï a plantarse con fines comerciales inmediatamente. se introdujo a chile en 1968 y posiblemente fue reintroducida a principios de los 90, por lo que era una variedad conocida en el paï s antes del inicio de las exportaciones de naranjas.
El ï rbol de las naranja washington navel es compacto, vigoroso y de buen desarrollo. posee una copa esfï rica con un hï bito de crecimiento abierto y ligeramente caï do con ramas que alcanzan el suelo. Su recolecciï n se suele dar de diciembre hasta marzo, segï n zona. es una de las variedades que mï s se cultiva en espaï a por que es ideal tanto para zumo como para su consumo de fruta fresca. La naranja washington navel es una especie subtropical que no tolera las heladas ni la fuerte salinidad en el suelo.

Categorï a: Citrus
Familia: Rutaceae
Gï nero: Citrus
Especie: sinensis "Washington Navel"
Zona Geogrï fica de Origen: Europa mediterrï nea
Zonas Climï ticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbol
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Gennaio / Febbraio / Marzo / Dicembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Bianco
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Fitocella / Arbol

Colore Frutti: Arancione 
Perfumado: Si