
Buganvilla



La especie es originaria de Brasil, (Bahï a, Minas Gerais, Paranï , Rï o de Janeiro, Santa Catarina y Sao Paulo), donde vive en los bosques costeros alargando sus ramas sobre los ï rboles en los cuales se ancla con las espinas recurvas.ï Es un arbusto sarmentoso siempreverde, deciduo en cultivaciï n en los climas mï s frï os o con una prolongada estaciï n seca, muy ramificado, con ramas recurvas o ascendentes, que pueden superar los 10 m si encuentran un soporte donde apoyarse con las robustas espinas recurvas, largas hasta cerca 1,5 cm.ï Las inflorescencias son panojas axilares producidas sobre ramas jï venes, llevando grupos de tres pequeï as flores verticiladas (o sea insertadas sobre el mismo nudo) tubulares, de color blanco crema, circundadas por tres vistosas brï cteas petaloides oblongos o elï pticos, de color pï rpura o magenta.

LaïBougainvilleaï con sus variedades e hï bridos, es una especie de gran valor ornamental y paisajï stico para las zonas de clima tropical, subtropical y templado cï lido, utilizable, por su versatilidad, en una amplia variedad de modos, como ejemplar aislado, tambiï n como arbolito, con oportunas podas, para cercas, como flor de corte, lï mites de terrenos defensivo, como cubre suelo, apoyada a un muro o haciï ndola trepar sobre los ï rboles, como en la naturaleza.

Requiere una exposiciï n en pleno sol, la sombra inhibe la floraciï n, y suelos bien drenantes, siendo bastante sensible al estancamiento hï drico, preferiblemente ï cidos o neutros, pero se adapta tambiï n a los moderadamente calcï reos. Soporta elevadas temperaturas y, bien enraizada, perï odos de sequï a; resiste el viento, la salinidad, y puede ser por lo tanto empleada en proximidad del mar, y elevados niveles de poluciï n, los cuales se encuentran en ï reas industriales y urbanas.

En cuanto a la resistencia a las bajas temperaturas, las hojas se daï an apenas bajo 0 ï C, los tallos resisten hasta cerca -5 ï C, mientras a nivel radical puede soportar temperaturas inferiores, especialmente si estï bien cubierta.

Han sido seleccionadas numerosas variedades, diferente por color, nï mero de brï cteas o porte. Se adapta a la cultivaciï n en maceta, en particular las variedades de porte enano y compacto, para la decoraciï n de terrazas, patios, galerï as y jardines de invierno, utilizando como sustrato turba, arena silï cea y tierra comï n de jardï n en partes iguales, la arena puede ser sustituida por perlita, es a menudo utilizada como bonsï i.
La posiciï n debe ser lo mï s luminosa posible, los riegos regulares en verano, pero dejando secar el estrato superior del sustrato antes de volver a regar, distanciadas en invierno; ï tiles las fertilizaciones cada 15 dï as durante el perï odo vegetativo, utilizando productos hidrosolubles balanceados con microelementos, para evitar fenï menos de clorosis, mitad de la dosis aconsejada en el prospecto.
Particular atenciï n a los trasplantes, sï lo cuando sean necesarios, evitando molestar las raï ces, transfiriendo el pan de tierra ï ntegro al nuevo contenedor.ï

Categorï a: Bougainvillea
Familia: Nyctaginaceae
Gï nero: Bougainvillea
Especie: sanderiana
Zona Geogrï fica de Origen: Amï rica del sur
Zonas Climï ticas: Clima tropical
Porte: Arbusto-Planta enredadera
Hojas: Semi-siempreverde
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Marzo / Aprile / Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
Flor: Tuboloso
Colore Fiori: Viola
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Sol
Forma: Tierra roja / Maceta de barro / Cuenco / Bonsai / Maceta de balcï n / Espaldera / planta en caï a / Piramide / Arbolito entrelazado / Arbol / Vaso suspenso / Basket / Espiral / Arbusto