
Cidra



Es unï ï rbolï pequeï o oï arbustoï perennifolio, de 2,5 a 5 m de altura, con elï fusteï retorcido yï ramajeï den y rï gido, con espinas en las axilas foliares. Lasï hojas, de pecï olos cortos, son simples, alternas, elï pticas a lanceoladas, de hasta 18 cm de largo, de superficie coriï cea y color verde oscuro por el haz, con una distintiva fragancia de limï n. Produceï floresï hermafroditas, fragantes, de buen tamaï o, blancas o purpï reas, formando racimos pequeï os. Tienen de 4 a 5ï pï talos, con 30 a 60ï estambres.
Elï frutoï es unï hesperidioï oblongo o globoso, raramente piriforme, de hasta 30 cm de diï metro, variando mucho entre ejemplares y aï n en el mismo ejemplar, con el estilo bien marcado. Estï recubierto de una cï scara gruesa, carnosa, pegada al endocarpo, de color amarillo o verdoso, conï glï ndulasï oleosas pequeï as y frecuentemente rugosa. Tiene 10 a 15ï carpelos, firmes, poco jugosos, dulces o ï cidos segï n la variedad. Normalmente las semillas son pequeï as, monoembriï nicas, lisas, blancas por dentro y abundantes.
Requiere bastante sol, suelo bien aireado, y tolera mal los extremos de temperatura y humedad; a diferencia de otros cï tricos, no atraviesa una fase invernal de reposo. Por el peso de los frutos debe tenerse cuidado de podar las ramas largas, o colocarles soportes para que resistan durante todo el crecimiento de estos.
ï Estï en flor la mayor parte del aï o, produciendo fruta constantemente, aunque la mayor parte se produce en primavera. Tarda unos tres meses en alcanzar la forma madura, con la piel amarillo intenso y un profundo aroma. Para uso culinario normalmente se la recoge aï n verde, con entre 12 y 15 cm de diï metro.
Exteriormente, este fruto se parece a un limï n; pero, a diferencia de ï sta, tiene muy poco jugo.
Actualmente, se valora mucho la fragancia de la cidra. Su fruto (incluida la piel) es objeto de comercio internacional y se utiliza mucho como ingrediente en la industria agroalimentaria.
El Citrus medica se utiliza en rituales religiosos de los judï os durante la Fiesta de los Tabernï culos y se le considera un sï mbolo del pueblo judï o.
Se le considera originario del sudoeste de Asia, donde se le encuentra silvestre y cultivado. La expansiï n por el ï rea de clima mediterrï neo estï documentada ampliamente; actualmente, es un cultivo tï pico de Cï rcega y de Grecia y de Italia.

Categorï a: Citrus
Familia: Rutaceae
Gï nero: Citrus
Especie: medica
Zona Geogrï fica de Origen: Asia, sub-continente indio
Zonas Climï ticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbol
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Gennaio / Febbraio / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
Flor: Raï m (inflorescï ncia)
Colore Fiori: Bianco
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Media agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol

Forma: Espaldera / Cono invertido / Arbol / Arbusto
Periodo de Fructificaciï n: Gennaio / Febbraio / Ottobre / Novembre / Dicembre
Colore Frutti: Giallo
Perfumado: Si