
Le palmier nain



Le palmier nain, palmier doum ou faux palmier doum (*Chamaerops humilis* L.) est un palmier de petite taille, originaire des r gions bordant la mer M diterran e occidentale. Il est appr ci comme plante ornementale.

C'est la seule esp ce du genre *Chamaerops* (genre monotypique qui doit son nom au grec *chamai*, nain , et *rhips*, buisson [2]). Les autres esp ces initialement class es dans ce genre ont t reclass es dans des genres voisins comme *Trachycarpus*, notamment *Chamaerops fortunei* devenu *Trachycarpus fortunei*.

Les Grecs appelaient le *Chamaerops humilis*, *Phoenix chamaeriphes*, ce qui signifie litt ralement palmier jet terre . Cette plante est l'origine du jour chameropsi qui d signe le quatorzi me jour du mois de flori al dans le calendrier r publicain, soit l' quivalent du 3 mai dans le calendrier gr gorien.

Le Chamaerops est une plante cespiteuse ; plusieurs tiges sont g n r es par le m me pied.

Chamaerops humilis est une esp ce dio que. C'est un palmier nain, presque acaule l' tat sauvage, ne d passant pas deux m tres, qui peut cependant atteindre six huit m tres de haut en culture dans sa vari t *Arborescens*. Il se caract rise notamment par son faux-tronc (stipe) drageonnant. Sa croissance lente favorise l'apparition de nombreux rejets sa base l'origine de son apparence en touffe. Au Maroc, on trouve dans les cimeti res qui entourent les koubas des spi cimens faux-tronc d velopp , car chappant au broutage des troupeaux. Ces spi cimens sont ainsi prot g s de fait et peuvent se d velopper.

Les feuilles, dispos es en rosette terminale, sont palm es en forme d'ventail de 90 cm de diam tre. Le p tiole, long et gr le (jusqu' un m tre de long), est tr s pineux. Le limbe est diss qu en 10 20 pseudo-folioles allong es et aigu s, raides et coriaces. Les feuilles sont vertes la face sup rieure et presque blanches en dessous.

L'inflorescence est un spadice, entour d'une spathe courte (30 cm de long), comprenant de nombreuses petites fleurs jaunes, m les ou femelles. C'est g n ralement (mais pas toujours) une plante dio que, portant les fleurs m les et les fleurs femelles sur des pieds s par s.

Les fleurs mï les ont de 6 ï 9ï ï taminesï qui surmontent un calice charnu, les fleurs femelles comptent troisï carpellesï monocarpiques charnus.
Les fruits semblables ï des dattes sont desï drupesï oblongues de couleur brun rougeï tre ï maturitï , de longueur variable (de 2 ï 5ïcm), rassemblï s en une grappe. Leur pulpe est trï s fibreuse et lï gï rement sucrï e. Trï s astringents, ils ne sont pas comestibles pour les palmiers indigï nes d'Europe. Lavï s et bouillis, cette cuisson fait partir l'ï pretï et l'aciditï .
*Chamaerops*ï compte deuxï variï tï s, rï pandues dans le Sud de l Europe (Balï ares,ï Italie,ï Sardaigne,ï Sicile,ï Espagne,ï Portugal) et Sud de la France, et le Nord de l Afrique (Maroc,ï Algï rie,ï Tunisie,ï Libye).

- *Chamaerops humilis*ï var.ï*humilis*. Feuilles vertes.
- *Chamaerops humilis*ï var.ï*argentea*ï Andrï ï (syn.ï*C. humilis*ï var.ï*cerifera*ï Becc.). Feuilles grises.ï Atlas, Afrique du Nord. Rï putï ï
- *Chamaerops humilis*ï var.ï*vulcano*. De port compact et sansï pine. Les feuilles sont plusï paisses et la plante plus touffue que chez les variï tï sï*Humilis*ï etï*Argentea*.

Il pousse dans des zones sï ches, sur des terrains rocailleux ou sableux, du bord de mer jusquï 1ï 200ï mï tres d altitude (auïMarocï etïAlgï rie), dans un climat plutï t froid en hiverï ; il prï fï re les expositions ensoleillï es et est assez rustique. Il peut supporter des gelï es brï ves allant jusqu'ï 12ïï C et certaines populations naturelles sont rï guliï rement couvertes de neige mais il ne vï gï te qu'ï partir deï10ïï C ï et a besoin pour prospï rer de tempï ratures allant de 22 ï30ï C.

Categorï a: Palmeras
Familia: Arecaceae
Gï nero: Chamaerops
Especie: humilis subsp. humilis
Zona Geogrï fica de Origen: Europa mediterrï nea / ï frica central-norte
Zonas Climï ticas: Mediterraneo: Sud ed Isole, Colina USDA 10 a
Porte: Palmeras de mï s tallos
Hojas: Hoja en forma de abanico
Colore Foglie: Verde ï Grigio
Periodo de Floraciï n: Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Raï m (inflorescï ncia)
Colore Fiori: Giallo
Suelo: Neutro / Caliza / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Poca agua
Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Palmera
Colore Frutti: Viola