Limettier



Le limettier acide (C. micrantha x C. medica)ï ï est originaire d'Asie du Sud-Est, sa proximitï gï nï tique avec le combava (C. hystrix), le macroptï re (C. macroptera) et C.micrantha laisse penser au sud tropical de la rï gion (Malaisie, Philippines).
C'est un joli arbuste florifï re de 3 ï 5 m de haut.
En climat tropical et subtropical il est couvert toute l'annï e de petites fleurs blanches et rouges. La production de fruits (les limes ou citrons verts), sphï riques, de 2,5 ï 5 cm de diamï tre10, est continue.
En climat mï diterranï en chaud la floraison se produit au printemps et ï l'automne. La rï colte du fruit se fait 160 jours aprï s l anthï se, ï maturitï le fruit passe de vert foncï ï vert, juteux. Son aciditï est la plus ï levï e 150 jours aprï s l anthï se et diminue lï gï rement par la suite.

Catï gorie: Citrus
Famille: Rutaceae
Genre: Citrus
Espï ce: x aurantiifolia
Zone Gï ographique d'Origine: Asie du sud est
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et ï les
Port: Arbuste
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Marzo / Aprile / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Fleur simple
Colore Fiori: Bianco
Sol: Moyennement acide / Moyenne sol
Besoins en Eau: Peu d'eau / Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Tige
Colore Frutti: Giallo

Parfumï : oui