
Mimosa d hiver



L ï*Acacia dealbata*ï Link (1822) est originaire de l Australie (Nouvelle-Galles du sud, Tasmanie, Territoire de la capitale et Victoria) oï on la trouve aussi bien dans les forï ts xï rophiles qu humides, entre 300 et 1 000 m d altitude.

ï Le nom du genre latin*Acacia*ï dï rive du grec akakia, utilisï par Thï ophraste et Dioscoride, pour indiquer un arbre ï pineux ï gyptien, probablement dï rivï de akï = ï pine, pointe; le nom de l espï ce en latin dealbata = blanchi, fait rï fï rence ï la couleur grisï tre des jeunes branches et des feuilles.

Il s agit d un arbuste ou d un arbre ï feuillage persistant, inerme, ï la croissance rapide, qui peut atteindre en pleine nature, dans les forï ts humides ou le long des cours d eau, les 25 ï 30 m de haut, mais qui en culture ne dï passe jamais les 7-9 m ï cause des frï quents ï lagages nï cessaires pour maintenir le feuillage compact, qui est par nature dï sordonnï . L ï corce initialement lisse et de couleur variant du gris au noirï tre, tend ï se fissurer avec l ï ge. Les feuilles, d une longueur d environ 15 cm, sont bipennï es avec des pinnules de 5-6 cm de long, de couleur gris vert ï gris bleuï tre.

Les fleurs hermaphrodites, trï s parfumï es, apparaissent entre janvier et mars. Elles sont formï es par des capitules globuleux, de 5-6 mm de diamï tre, ï l aspect plumeux par de nombreuses ï tamines jaunes rï unies en grappe axillaire ou terminale d une dizaine de centimï tres. Le fruit est une gousse de 5-9 cm, plutï t aplatie et d une largeur de 1 cm environ, qui contient des graines rï niformes noires d environ 5-6 mm.

La reproduction se fait par bouture semi-ligneuse en ï tï ou par graines; pour faciliter leur germination, il faut les scarifier, ou les immerger auparavant dans un verre d eau chaude en les oubliant pendant deux jours, ou bien les plonger une minute dans de l eau bouillante. En effet dans la nature la dormance, qui peut durer mï me des dizaines d annï es est habituellement stoppï e par des incendies.

L espï ce, d une grande valeur ornementale pour son ï lï gant feuillage et sa splendide floraison, doit ï tre cultivï e en plein soleil, dans un endroit abritï des vents, et dans des sols bien drainï s acides ou neutres ; pour les sols alcalins, elle doit ï tre greffï e sur d autres Acacias rï sistantes au calcaire (en gï nï rale surï *A. rï tinoides*).

ï L'*Acacia dealbata*ï prï sente une bonne rï sistance aux basses tempï ratures, jusqu ï -8ï C sur de courtes pï riodes et avec des exemplaires adultes en bonne forme. Cet arbre a besoin d ï lagages pï riodiques,

pour maintenir le feuillage compact, et il faut surveiller les pousses radicales, envahissantes, produites en grand nombre mï me ï une certaine distance du tronc. L espï ce s utilise non seulement pour l ornemental et la production d inflorescences, en particulier pour la Journï e International de la Femme, ses fleurs ï tant comestibles sont parfois consommï es en beignets. L exsudat gommeux du tronc peut aussi ï tre employï comme substitut de la gomme arabique (habituellement obtenue d autres espï ces du mï me genre, en particulier l ï*Acacia Sï nï gal* ou l ï*Acacia seyal*).
Les fleurs sont utilisï es dans l industrie des parfums et des colorants ; de plus l ï corce est riche en tanin. Le bois est enfin trï s apprï ciï , pour sa facilitï d utilisation et la beautï du produit fini, d oï son utilisation dans l industrie du meuble.

Catï gorie: Plantes ï fleurs pour l'extï rieur
Famille: Fabaceae
Genre: Acacia
Espï ce: dealbata
Zone Gï ographique d'Origine: Ocï anie
Zones Climatiques: Littoral subtropical, sud de l'Italie et ï les
Port: Arbre
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Gennaio / Febbraio / Marzo
Fleur: La grappe
Colore Fiori: Giallo
Sol: Moyennement acide / Moyenne sol
Besoins en Eau: Eau moyenne
Exposition ï la Lumiï re: Demi ombre / Plein soleil
Forme: Tressage de canne / Tige / En buisson
Colore Frutti: Marrone
Parfumï : oui