
Chardon d Inde



Opuntia ficus-indica, cultivï depuis l Antiquitï et maintenant naturalisï dans de nombreuses rï gions tropicales, subtropicales et tempï rï es chaudes, pourrait ï tre indigï ne du Mexique.
Espï ce arbustive aux longues tiges mesurant jusqu ï 5 m, constituï es de segments aplatis, les cladodes, communï ment appelï s ï ï raquettesï ï ; ces cladodes sont des tiges modifiï es, ï la forme obovale ou elliptique, de 20 ï 50 cm de long, de 10 ï 25 cm de large et ï pais de 2 ou 3 cm, ï la peau verte ou gris-vert. Ils assurent la fonction chlorophyllienne. La mince couche de cire qui recouvre leur surface a pour fonction de limiter la transpiration, et donc la perte de liquides et de reflï ter une partie de la lumiï re. Pendant leur phase de croissance, les cladodes sont munis de feuilles coniques rudimentaires, mesurant 3 ï 4 mm de long, disposï es en spirale, persistant pendant une courte pï riode.
Grï ce ï sa grande adaptabilitï ï diffï rentes conditions environnementales et ï la facilitï avec laquelle elle est dissï minï e par les animaux, l espï ce s est rï pandue et naturalisï e dans diverses parties du globe, en particulier dans le bassin mï diterranï en, l Australie et l Afrique du Sud, ï touffant souvent la vï gï tation locale.
Les sols rocheux ou sablonneux, arides ou semi-arides, mï me pauvres, en plein soleil, constituent l environnement idï al pour la culture, ï condition qu ils soient parfaitement drainants, dans des rï gions oï les tempï ratures annuelles moyennes sont supï rieures ï 18 ï C, conditions environnementales donc difficile ï utiliser pour d autres cultures.
En ce qui concerne la rï sistance aux basses tempï ratures, les jeunes plants peuvent ï tre dï jï endommagï s au voisinage de -3 ï C, les plantes adultes pouvant supporter, sans dommages excessifs, des tempï ratures jusqu ï environ -6 ï C, tandis que la base, si elle est lignifiï e, peut survivre jusqu ï -10 ï C pendant une courte pï riode.
Du point de vue ornemental son emplacement idï al se trouve dans de grands jardins dï sertiques , oï , dans tous les cas, son emplacement devra ï tre soigneusement choisi, ï l ï cart des lieux de passage, ï tant donnï la taille qu il peut ï tre atteindre et la prï sence des glochides et des ï pines ; ces caractï ristiques en font une excellente plante pour rï aliser des barriï res dï fensives. En raison de la large zone et de l ancienneti de sa culture, l espï ce a donnï lieu ï de nombreuses variï tï s, qui diffï rent ï la fois par les caractï ristiques des fruits et des gladodes et qui sont sï lectionnï es selon l usage auquel elles

sont destinï es.
Les fruits, qui doivent ï tre manipulï s avec prï caution en raison de la prï sence de glochides gï nants et douloureux, sont consommï s frais ou transformï s pour la production de boissons alcoolisï es, de jus de fruits, de confitures, etc.ï

Catï gorie: Plante succulente
Famille: Cactaceae
Genre: Opuntia
Espï ce: ficus indica
Zone Gï ographique d'Origine: Amï rique centrale
Zones Climatiques: Mï diterranï e, sud et ï les, collines. Usda 10 a
Port: Succulent
Feuilles: Feuilles persistantes
Colore Foglie: Verde
Pï riode de Floraison: Aprile / Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Fleur: Fleur simple
Colore Fiori: Giallo ï Rosso ï Viola
Sol: Moyennement basique / Neutre / Moyenne sol
Besoins en Eau: Peu d'eau
Exposition ï la Lumiï re: Plein soleil
Forme: En buisson
Colore Frutti: Verde ï Giallo ï Rosso ï Arancione ï Bianco ï Rosa ï Viola