
Die Blutorange 'Moro'



Die Blutorange 'Moro' (Citrus sinensis) hat ihren Zï chtungsursprung in Italien. Sie wï chst zu kompakten, dornenlosen oder wenig bedornten Pflanzen von mittlerer Grï ï e mit mittelgroï en (2-3 cm), weiï en, intensiv sï ï duftenden Blï ten heran, die ihre Hauptzeit in den Frï hsommerwochen haben. Das Fruchtfleisch fï rbt sich von allen Blutorangen- Sorten zur Vollreife am zuverlï ssigsten rot bis tief violett (brombeerfarben) und entwickelt ein intensives Aroma. Die Schale fï rben sich dagegen nur leicht rï tlich oder bleiben orangefarben. 'Moro' neigt wie Tarocco im kommerziellen Anbau zu Alternanz; die wir jedoch unter hiesigen Kulturbedingungen an Zierpflanzen bisher nicht beobachten konnten. Da Orangenfrï chte generell recht groï sind, dï rfen Sie bei keiner Orangensorte so hohe Stï ckzahlen wie bei Kumquat oder Mandarine erwarten. Werden 'Moro'-Frï chte nach der Vollreife nicht geerntet, kï nnen sie monatelang zur Dekoration hï ngen bleiben.

Kategorie: Zitruspflanzen
Familie: Rutaceae
Gattung: Citrus
Art: sinensis "Moro"
Geographisches Ursprungsgebiet: Mittelmeer Europa
Klimazonen: Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
Habitus: Baum
Blï tter: Immergrï n
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Gennaio / Febbraio / Marzo / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Blume: Einfache blï te
Colore Fiori: Bianco
Bodenart: Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich
Erfordernissen: Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Halbschatten / Sonne
Form: Hochstamm

Fruchtzeitperiode: Gennaio / Febbraio / Marzo / Novembre / Dicembre
Colore Frutti: Arancione ï Rosso
Parfï miert: ein