
Washington Navel' Orangen



Washington Navel'-Orangen sind vermutlich im Jahre 1873 von Brasilien nach Kalifornien gelangt. Der Wuchs ist orangentypisch kompakt, die Blï tter tief dunkelgrï n und mit einem schmalen Blattflï gelchen versehen. Die Blï ten mit Schwerpunkt im Frï hsommer erreichen mittlere Grï ï en von 2-3 cm, sie sind weiï und intensiv sï ï duftend. Fï r die runden, orangeschaligen, gut 10 cm groï en Frï chte charakteristisch ist der ï Nabelï an der Fruchtbasis. Er bildet sich durch eine zweite, kleinere Frucht, die in die grï ï ere eingestï lpt ist. Schneidet man die Frï chte auf, ist diese ï Tochterfruchtï als eigener Kranz aus Fruchtstï ckchen sichtbar. Nabelorangen-Frï chte sind sicher samenlos und leicht zu schï len. Die Fruchtsegmente trennen sich leicht voneinander, was sie fï r den Direktverzehr besonders beliebt macht. Hinzu kommt das ausgewogene Zucker-Sï ure-Verhï ltnis. Da Nabel-Orange wie alle Orangen keine Probleme mit kï hleren Temperaturen haben, kï nnen sie jedes Jahr einen langen Freilandaufenthalt von April bis Oktober genieï en, der sie krï ftig und schï dlingsfrei hï lt.

Kategorie: Zitruspflanzen
Familie: Rutaceae
Gattung: Citrus
Art: sinensis "Washington Navel"
Geographisches Ursprungsgebiet: Mittelmeer Europa
Klimazonen: Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
Habitus: Baum
Blï tter: Immergrï n
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Gennaio / Febbraio / Marzo / Dicembre
Blume: Einfache blï te
Colore Fiori: Bianco
Bodenart: Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich
Erfordernissen: Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Halbschatten / Sonne

Form: Fitocella / Hochstamm
Colore Frutti: Arancione
Parfï miert: ein