
# Die Zitronatzitrone



Die Zitronatzitrone (Citrus medica) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Zitruspflanzen in der Familie der Rautengewï chse (Rutaceae). Zitronatzitronen gelten als die ersten auf dem europï ischen Kontinent angebauten Zitrusfrï chte.
Ursprï nglich aus Sï dostasien stammend wird sie heute vorwiegend in Kalabrien, Sizilien, Marokko, Kreta, Korsika sowie Puerto Rico angebaut.ï
Der Strauch oder kleine Baum bildet eine unregelmï ï ig geformte Krone. Die Pflanze ist relativ kurzlebig und bildet nur leichtes Holz. Junge Zweige sind kantig und rï tlich gefï rbt, sie sind in den Blattachseln mit kurzen, dicken Dornen besetzt.
Die Blï tter sind oval, mit stumpfer Spitze und abgerundetem oder keilfï rmigem Blattgrund. Der Blattrand ist gezahnt. Der Blattstiel ist kurz, nicht oder nur wenig verbreitert. Die Blattspreite ist vom Blattstiel nur undeutlich abgesetzt.
Die duftenden Blï ten stehen in wenigblï tigen Blï tenstï nden in den Blattachseln. Die Blï tenknospen sind rï tlich, die Blï tenblï tter sind oberseits weiï , unterseits rï tlich. Etwa 30 bis 40 (60) Staubblï tter sind vorhanden. Der Fruchtknoten ist zylindrisch und geht allmï hlich in den Griffel ï ber. Manchmal bleibt der Griffel auch an der reifen Frucht erhalten. Ein Teil der Blï ten ist funktional mï nnlich mit verkï mmertem Fruchtknoten.
Die Frï chte mit unregelmï ï iger, hï ckeriger, sehr dicker Schale kï nnen bis zu 25 cm lang und 4 kg schwer werden. Sie sind oval geformt, oft mit einer Ausstï lpung an der Spitze, wie man sie von der Zitrone kennt. Die ï uï ere Schale ist bei der Reife gelb und duftet, darunter befindet sich das dicke weiï e Mesokarp. Das Innere der Frucht ist in zehn bis 13 Segmente aufgeteilt, das hellgrï ne Fruchtfleisch kann sï ï  oder sauer sein, nimmt aber nur einen geringen Teil der Frucht ein. Die Samen sind glatt, an einem Ende zugespitzt, im Innern weiï . Sie enthalten jeweils nur einen Embryo.

**Kategorie:** Zitruspflanzen
**Familie:** Rutaceae
**Gattung:** Citrus
**Art:** medica

**Geographisches Ursprungsgebiet:** Asien, Indischer Subkontinent
**Klimazonen:** Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
**Habitus:** Baum
**Blï tter:** Immergrï n
**Colore Foglie:** Verde
**Blï teitperiode:** Gennaio / Febbraio / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
**Blume:** Traube
**Colore Fiori:** Bianco
**Bodenart:** Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich
**Erfordernissen:** Mï ssig Wasser
**Lichtexposition:** Halbschatten / Sonne
**Form:** Spalier / Sï ule / Hochstamm / Strauch
**Fruchtzeitperiode:** Gennaio / Febbraio / Ottobre / Novembre / Dicembre
**Colore Frutti:** Giallo
**Parfï miert:** ein