Clementinenbaum



Clementinen sind eine groï e Gruppe von Kreuzungen aus Mandarine (C. reticulata) mit vermutlich Bitterorangen (C. aurantium);. Ihren Namen verdanken die zumeist dornenlosen Sorten Pater Clemente Rodier aus Algerien, der Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Clementinen wachsen auch ohne konsequenten Schnitt schï n kompakt und dicht belaubt. Ihre Blï tter sind etwas breiter als bei Mandarinen, aber immer noch schmal im Vergleich zu Orangen oder Zitronen.
Die kleinen bis mittelgroï en (1,5-2,5 cm), ï beraus zahlreichen, weiï en, intensiv sï ï lich-herb duftenden Blï ten haben ihre Hauptblï tezeit im Frï hjahr (April/Mai) oder/und Herbst (Oktober/November) ï ber einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Die Frï chte sind ein echter Genuss, denn sie enthalten wenige bis gar keine Kerne.ï Das Fruchtfleisch ist etwas weniger aromatisch als bei den Mandarinen, aber dafï r sehr saftreich, sehr sï ï und frei von herben Beitï nen.
Der Baum kann etwa vier bis sechs Meter groï werden.ï

Kategorie: Zitruspflanzen
Familie: Rutaceae
Gattung: Citrus
Art: x clementina
Geographisches Ursprungsgebiet: Nord-Zentralafrika
Klimazonen: Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
Habitus: Baum
Blï tter: Halbimmergï ne
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Gennaio / Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre
Blume: Einfache blï te
Colore Fiori: Bianco
Bodenart: Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich
Erfordernissen: Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Halbschatten / Sonne

Form: Spalier / Hochstamm / Strauch
Colore Frutti: Arancione 
Parfï miert: ein