
Kranzschlinge



Dieï Kranzschlingeï (Stephanotis floribunda) ist eine Pflanzenart aus derï Gattungï Stephanotisï in derï Unterfamilieï derï Seidenpflanzengewï chseï (Asclepiadoideae). Die Heimat der Kranzschlinge liegt in Bergregionenï Madagaskars. Sie kommt wild aber auch in der ï stlichenï Kapprovinzï vor.ï Sie ist sehr frostempfindlich, aber inï Mitteleuropaï alsï Zimmerpflanzeï hï ufig kultiviert.
Die Kranzschlinge ist einï immergrï nerï Kletterstrauch, der etwa 4 bis 5 Meter hoch wird. Die lederartigenï Blï tterï werden bis etwa 5 ï 9ï cm groï ; sie sind glï nzend dunkelgrï n. Dieï Blï tenï stehen in achselstï ndigenï Trugdolden. Die Blï ten sind weiï und wachsartig; sie verstrï men einen angenehmen Duft. Die Blï tezeit erstreckt sich auf derï Nordhalbkugelï etwa von Juni bis September. Die Kranzschlinge bildet groï e pflaumenartige Frï chte, die allerdings bei als Zimmerpflanzen kultivierten Exemplaren nur selten ansetzen. Die Frï chte reifen ein Jahr lang; im Reifezustand springen sie auf und geben die braunen, silbrig beflockten Samen frei.
Die Kranzschlinge ist eine beliebte Zimmerpflanze. Im Winter benï tigt sie eine Ruhetemperatur von etwa 12 bis 15ï ï C, damit sie auch mehrere Jahre hintereinander reich blï hen kann.

Kategorie: Blï tenpflanzen fï r den Auï enbereich
Familie: Apocynaceae
Gattung: Stephanotis (= Marsdenia)
Art: floribunda
Geographisches Ursprungsgebiet: Madagaskar
Klimazonen: Regenklima der Tropen / USDA 11
Habitus: Strauch-Kletterpflanzen
Blï tter: Immergrï n
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Aprile / Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Blume: Tuboloso
Colore Fiori: Bianco
Bodenart: Schwash sauer / Sand / Mittelschwer Erdreich

Erfordernissen: Viel Wasser / Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Halbschatten / Sonne
Form: Spalier / Pyramide / Doppelt geformter Bogen
Colore Frutti: Marrone 
Parfï miert: ein